

MATEMATIKA „C”  
11. évfolyam

**10. modul**

**Ezt már mind tudjuk?**

Készítette: Kovács Károlyné

<b>A modul célja</b>	Ebben a tanévben tanult ismeretek felelevenítése, elhelyezése az eddigi ismeretek rendszerébe.
<b>Időkeret</b>	2 foglalkozás
<b>Ajánlott korosztály</b>	11. évfolyam
<b>Modulkapcsolódási pontok</b>	<p>Tágabb környezetben: Fizika, kémia.</p> <p>Szűkebb környezetben: Vektorműveletek. A függvény fogalma, értelmezési tartománya, értékkészlete. Egyenletek, egyenletrendszerek és egyenlőtlenségek megoldása. Síkgeometria.</p> <p>Ajánlott megelőző tevékenységek: Szögfüggvények fogalma, alkalmazása számolási feladatokban. Trigonometrikus függvények ábrázolása. Az egyenes és a kör egyenlete. Hatványozás értelmezése valós kitevőre, logaritmus fogalma, tulajdonságai. Valószínűségi számítás.</p> <p>Ajánlott követő tevékenységek: 12-edik évben folytatni a tanulmányokat.</p>
<b>A képességfejlesztés fókuszai</b>	<p>Rendszerezés, kombinatív gondolkodás, metakogníció.</p> <p>Az adott témakörben tanult ismeretek alkalmazási lehetőségének felismerése különböző szöveggörnyezetben. Igaz-hamis állítások kiválasztása. Hibás gondolatmenet felismerése. A kreatív gondolkodási mód fejlesztése.</p>

**JAVASLAT:**

Ez a modul a tanév utolsó két foglalkozását tartalmazza. Az egész évi tananyag áttekintése feladatokon keresztül nagyon fontos része a tanulásnak, csak sajnos nem mindig marad erre idő a tanórákon. Az első foglalkozás egy, a tanult témakörök tananyagát felelevenítő feladatsorból áll. A feladatok nincsenek tematikus elrendezésben, éppen azért, hogy elősegítsük a tanulók fejében a tanult tananyag egységbe, rendszerbe szerveződését. A másik foglalkozás - a vázlatban megadott témakörökben - a tanulói ismeretek felmérését szolgálja.

**A MODUL FOGLALKOZÁSAINAK JAVASOLT SORRENDJE:**

1. foglalkozás: **Csak vegyesen!**
2. foglalkozás: **Ezzel vége?**

**MODULVÁZLAT**

	<b>Lépések, tevékenységek</b>	<b>Kiemelt készségek, képességek</b>	<b>Eszköz/ Feladat/ Gyűjtemény</b>
<b>I. Csak vegyesen!</b>			
1	A tanévben tanult ismeretanyag felelevenítése (nem tematikus rend szerint csoportosított) feladatokon keresztül	Értelmes memória, deduktív következtetés, rendszerezés	Feladatlap: 1–10. feladat
<b>II. Ezzel vége?</b>			
1	Teszt írása (vektor, szögfüggvények, alkalmazása sokszögekben, hatványozás, logaritmus, koordináta-geometria, valószínűségszámítás)	Értelmes memória, metakogníció, kombinatív gondolkodás	Teszt: 1–20. feladat

## I. CSAK VEGYESEN!

Az olyan tanítási módszer, amely előtérbe helyezi a tanulók önálló foglalkoztatását, nagyon időigényes, de azt mutatják a tapasztalatok, hogy hatékonyabb a tanárközpontú módszernél. Éppen az időigényesség miatt ritkán jut idő a tanévvégi ismétlésre. Abban szinte minden tanár egyetért, hogy az egész évben megismert fogalmak, ismeretek áttekintése, azok rendszerezése, az eddigi ismeretekbe való beágyazása nagyon hasznos lenne. A délutáni foglalkozáson lehetőséget teremtünk erre.

Javaslat: A feladatokat csoportfoglalkozás keretében oldják meg. A csoportok számára ugyanazokat a feladatokat tűzzük ki, s abban a sorrendben, ahogyan az a tanulói munkafüzetben is szerepel. (A tematikus ismétlés nem segíti az ismeretek rendszerré válását.) Bizonyos időközönként adjunk lehetőséget a csoportoknak, hogy megoldásaikat összevegyék! Ha szükséges, egy-egy felmerülő problémát frontálisan beszéljünk meg.

1. Add meg a következő függvények lehető legbővebb értelmezési tartományát!

a)  $f(x) = 2^{\sin x}$       b)  $g(x) = \lg \cos^2 x$       c)  $h(x) = \log_{0,5}(2^{2x} - 2^x)$

*Megoldás:*

a) Az  $f(x)$  értelmezési tartománya (ÉT)  $\mathbf{R}$ , mert minden valós számnak értelmezzük a szinuszt, és a 2-nek tetszőleges valós kitevőjű hatványát.

b) A  $g(x)$  ÉT-a  $\mathbf{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + n\pi, n \in \mathbf{Z} \right\}$ , mert  $0 \leq \cos^2 x \leq 1$ , és e számok közül csak a nul-

lának nincs tízes alapú logaritmus, így  $\cos^2 x \neq 0$ , azaz  $\cos x \neq 0$ .

c) A  $g(x)$  ÉT-a  $\mathbf{R}^+$ . A  $2^{2x} - 2^x > 0$ , azaz  $2^x(2^x - 1) > 0$  egyenlőtlenségnek kell teljesülnie. Mivel  $2^x$  pozitív minden valós  $x$  számra, így a  $2^x > 1$  egyenlőtlenség megoldáshalmaza a keresett értelmezési tartomány.  $1 = 2^0$ , és a 2-es alapú exponenciális függvény szigorúan növekvő a pozitív számok halmazán, ezért  $x > 0$  és  $x \in \mathbf{R}$ .

2. a) Add meg az  $\mathbf{a}(\sqrt{3} \cdot \cos 150^\circ; 2 \cdot \sin 150^\circ)$  és  $\mathbf{b}(4; 4 \cos(-60)^\circ)$  vektorok koordinátáinak tízes számrendszerbeli alakját!

b) Számítsd ki a két vektor skaláris szorzatát!

c) Mekkora a két vektor hajlásszöge?

*Megoldás:*

a)  $\mathbf{a}(\sqrt{3} \cdot \cos 150^\circ; 2 \cdot \sin 150^\circ) = \mathbf{a}(-1,5; 1)$  és  $\mathbf{b}(4; 4 \cos(-60)^\circ) = \mathbf{b}(4; 2)$ .

$$\mathbf{b) } \mathbf{ab} = -6 + 2 = -4$$

$$\mathbf{c) } |\mathbf{a}| = \sqrt{3,25} \text{ és } |\mathbf{b}| = \sqrt{20}, \text{ így } \mathbf{ab} = \sqrt{3,25} \cdot \sqrt{20} \cdot \cos \alpha, \text{ ahol } \alpha \text{ a két vektor hajlás-}$$

$$\text{szöge. } -4 = \sqrt{3,25} \cdot \sqrt{20} \cdot \cos \alpha \Rightarrow \cos \alpha = -\frac{4}{\sqrt{3,25} \cdot \sqrt{20}} \approx -0,4961.$$

Mivel  $0^\circ < \alpha < 180^\circ$ , így  $\alpha \approx 119,7^\circ$ .

**3.** Írd fel az  $A(-2;3)$  és  $B(4;1)$  pontok által meghatározott  $AB$  szakasz

**a)** felezőpontjának koordinátáit!

**b)** tartóegyenésének egyenletét!

**c)** felezőmerőlegesének egyenletét!

**d)** Thalesz-körének egyenletét!

*Megoldás.*

$$\mathbf{a) } F(1; 2)$$

**b)** Mivel  $\overrightarrow{AB}(6;-2)$ , így az  $AB$  egyenes egyik normálvektora:  $\mathbf{n}(1;3)$ . Az  $AB$  egyenes egyenlete:  $x + 3y = 7$ .

$$\mathbf{c) } f : 3x - y = 1$$

**d)**  $\overrightarrow{AF}(3;-1)$  és  $|\overrightarrow{AF}| = \sqrt{10}$ . Az  $AB$  szakasz Thalesz-körének egyenlete:

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 = 10, \text{ ahol } (x; y) \neq (-2;3) \text{ és } (x; y) \neq (4;1).$$

**4.** Oldd meg az alábbi egyenleteket a valós számok halmazán!

$$\mathbf{a) } 3^{x+2} = x + \sqrt{9^{8-x}}$$

$$\mathbf{b) } \log_2 \sin^2 x + \log_2 \cos^2 x + \log_2 4 = 0$$

$$\mathbf{c) } \sin^2 x + \sin x \cos x - 1 = 0$$

$$\mathbf{d) } 2^{\sin^2 x} \cdot 2^{2 \cos^2 x} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\sin x}$$

Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy a **b)** egyenletben nem célszerű alkalmazni a hatványlogaritmusára vonatkozó azonosságot, mert a  $\sin^2 x$  és a  $\cos^2 x$  között ismert kapcsolat van.

*Megoldás:*

$$\mathbf{a) } 1 \leq x \text{ és } x \in \mathbf{Z}. \text{ Ekkor } 3^{x+2} = x + \sqrt{9^{8-x}} \Leftrightarrow 3^{x+2} = 3^{\frac{16-2x}{x+1}}. \text{ A 3-as alapú exponen-}$$

$$\text{ciális függvény kölcsönösen egyértelmű hozzárendelésű, így } x+2 = \frac{16-2x}{x+1}, \text{ azaz}$$

$$(x+2)(x+1) = 16-2x \Leftrightarrow x^2 + 5x - 14 = 0.$$

A másodfokú egyenlet megoldásai: 2 és  $(-7)$ . Csak a 2 lehet megoldás, és behelyettesítéssel adódik, hogy valóban az.

**b)** Mivel sem  $\sin^2 x$ , sem  $\cos^2 x$  nem lehet nulla, így  $x \neq k \cdot \frac{\pi}{2}$ .

Ekkor  $\log_2 \sin^2 x + \log_2 \cos^2 x + \log_2 4 = 0 \Leftrightarrow \log_2 4 \sin^2 x \cdot \cos^2 x = 0$ . A alapú logaritmus definícióját alkalmazva:  $4 \sin^2 x \cos^2 x = 2^0$ , azaz  $4 \sin^2 x \cdot \cos^2 x = 1$ .

$$4 \sin^2 x \cdot (1 - \sin^2 x) = 1 \Leftrightarrow 4 \sin^4 x - 4 \sin^2 x + 1 = 0 \Leftrightarrow (2 \sin^2 x - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\sin^2 x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ vagy } \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + n \cdot \frac{\pi}{2}, \text{ ahol } n \in \mathbf{Z}.$$

Mivel e számok szinuszának és koszinuszának a négyzete  $\frac{1}{2}$  és

$$\log_2 \frac{1}{2} + \log_2 \frac{1}{2} + \log_2 4 = (-1) + (-1) + 2 = 0, \text{ az } x = \frac{\pi}{4} + n \cdot \frac{\pi}{2}, \text{ ahol } n \in \mathbf{Z} \text{ számok}$$

az egyenlet megoldásai.

**c)** Az  $x$  tetszőleges valós szám lehet.

$$\sin^2 x + \sin x \cos x - 1 = 0 \Leftrightarrow \sin^2 x + \sin x \cos x - \sin^2 x - \cos^2 x = 0 \Leftrightarrow$$

$$\sin x \cos x - \cos^2 x = 0 \Leftrightarrow \cos x \cdot (\sin x - \cos x) = 0 \Leftrightarrow \cos x = 0 \text{ vagy } \sin x = \cos x.$$

Az egyenlet megoldásai:  $x = \frac{\pi}{2} + n\pi$ , ahol  $n \in \mathbf{Z}$ , vagy  $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$ , ahol  $k \in \mathbf{Z}$ .

**d)** Az  $x$  tetszőleges valós szám lehet.

$$2^{\sin^2 x} \cdot 2^{2 \cos^2 x} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\sin x} \Leftrightarrow 2^{\sin^2 x + 2 \cos^2 x} = 2^{-\sin x}. \text{ Mivel a 2-es alapú expo-}$$

nenciális függvény hozzárendelése kölcsönösen egyértelmű, ezért a megoldandó

egyenlet:  $\sin^2 x + 2 \cos^2 x = -\sin x$ .

$$\sin^2 x + 2 \cos^2 x = -\sin x \Leftrightarrow \sin^2 x + 2 \cdot (1 - \sin^2 x) = -\sin x \Leftrightarrow$$

$$\sin^2 x - \sin x - 2 = 0.$$

A  $\sin x$ -re másodfokú egyenlet megoldásai:  $\sin x = 2$  vagy  $\sin x = -1$ . Mivel  $-1 \leq \sin x \leq 1$ , a  $\sin x = 2$  egyenletnek nincs megoldása, míg  $\sin x = -1 \Leftrightarrow$

$$x = \frac{3\pi}{2} + 2n\pi, \text{ ahol } n \in \mathbf{Z}.$$

Mivel  $\sin^2\left(\frac{3\pi}{2} + 2n\pi\right) = 1$ , továbbá a kapott gyökök koszinusza nulla, és


$2^1 \cdot 2^0 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$ , az egyenlet megoldásai valóban  $\frac{3\pi}{2} + 2n\pi$ , ahol  $n \in \mathbf{Z}$  számok.

5. Egy konvex négyszög egyik szöge derékszög, a közrefogó két oldal mindegyike  $a$  hosszú. A derékszöggel szemközti szög  $120^\circ$ -os, és e szöget közrefogó mindkét oldal  $b$  hosszú. Hányszorosa az  $a$  oldal a  $b$ -nek?

*Megoldás:*

A  $BDA$  derékszögű háromszög átfogója  $a\sqrt{2}$  hosszú. A  $DBC$  háromszög  $DB$  oldalára alkalmazzuk a koszinusztételt!

$2a^2 = 2b^2 - 2b^2 \cos 120^\circ$ , azaz  $2a^2 = 3b^2$ . Mivel  $a$  és  $b$  pozitív számokat jelölnek, így  $a = \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot b$ .



6. Az alábbi idézetek egy-egy iskolai dolgozattól valók. Keresd meg, és javítsd ki a hibákat!

1. „Az  $e: 3y - 2x = 5$  egyenletű egyenes egy pontja  $P(1; -1)$ . Ezen a ponton átmenő, az  $e$  egyenesre merőleges egyenes egyenlete:  $2x + 3y + 1 = 0$ .”

2. „A  $\log_3 x^2 - \log_3(x + 2) - 1 = 0$  egyenlet alaphalmaza azok az  $x$  valós számok, amelyekre  $-2 < x$  teljesül. Mivel  $1 = \log_3 3$ , az egyenlet:

$$\log_3 x^2 - \log_3(x + 2) - \log_3 3 = 0.$$

A logaritmus azonosságait alkalmazva:  $\log_3 x^2 - \log_3 \frac{x+2}{3} = 0$ , azaz  $\log_3 \frac{3x^2}{x+2} = 0$ .

A logaritmus definíciója szerint:  $\frac{3x^2}{x+2} = 1$ .”

3. „Ha a háromszög oldalainak hossza:  $a = 6 \text{ cm}$ ,  $b = 4 \text{ cm}$ , és a  $b$  oldallal szemközti szöge  $\beta = 30^\circ$ , akkor  $\frac{6}{4} = \frac{\sin \alpha}{\sin 30^\circ}$ , így  $\sin \alpha = \frac{3}{4}$ , és ebből  $\alpha \approx 49^\circ$ . A háromszög harmadik szöge kb.  $101,4^\circ$ .”

*Megoldás:*1. Hibák:

- ❖ Az  $e$  egyenesnek nem pontja a  $P(1;-1)$  pont, mert  $3(-1) - 2 \cdot 1 \neq 5$ .
- ❖ Az  $e$  egyenes egyik normálvektora  $\mathbf{n}_e(-2;3)$ , és ez a vektor a  $f$  egyenes egyik irányvektora, tehát az  $f$  egyenes egyik normálvektora:  $\mathbf{n}_f(3;2)$ , így a  $P(1;-1)$  ponton átmenő,  $e$  egyenesre merőleges egyenes egyenlete:  $3x + 2y = 1$ .

2. Hibák:

- ❖ Az egyenlet azon  $x$  valós számokra értelmezhető, amelyekre  $x \neq 0$  és  $-2 < x$ .
- ❖ Az  $\log_3 x^2 - \log_3(x+2) - \log_3 3 = 0$  egyenletben a  $\log_3 x^2$  kifejezésből kivonva nem a  $\log_3(x+2) - \log_3 3$  kifejezés van, hanem  $\log_3(x+2) + \log_3 3$ , mivel  $\log_3 x^2 - \log_3(x+2) - \log_3 3 = \log_3 x^2 - (\log_3(x+2) + \log_3 3)$ . Az utolsó egyenlet helyesen:  $\frac{x^2}{3(x+2)} = 1$ .

3. Hibák:

- ❖ A  $\sin \alpha = \frac{3}{4}$  egyenlet alaphalmaza a  $]0^\circ; 180^\circ[$  intervallum, és ezen a halmazon az egyenletnek két megoldása van:  $\alpha \approx 49^\circ$  és  $\alpha \approx 131^\circ$ . Mindkét szög esetén létezik a háromszög, így a feladat feltételeinek két háromszög tesz eleget.
- ❖ A háromszög belső szögeinek összege pontosan  $180^\circ$ , így a harmadik szög közelítő értéke nem adható meg  $101,4^\circ$ -osnak. Helyesen: Az egyik háromszög szögei:  $30^\circ$ , kb.  $49^\circ$  és kb.  $101^\circ$  (vagy  $30^\circ$ , kb.  $48,6^\circ$  és kb.  $101,4^\circ$ ).

7. Egy urnában 7 piros, 8 fehér és 9 zöld golyó van. Kihúzzunk egymás után három golyót.

Mennyi a valószínűsége annak, hogy mind a három kihúzott golyó fehér, ha

- a) a kihúzott golyót nem tesszük vissza
- b) a kihúzott golyót visszatesszük?

*Megoldás:*

$$\mathbf{a) P(A) = \frac{8}{24} \cdot \frac{7}{23} \cdot \frac{6}{22} = \frac{7}{253} \approx 0,028}$$

$$\mathbf{b) P(B) = \frac{8}{24} \cdot \frac{8}{24} \cdot \frac{8}{24} = \frac{1}{27} \approx 0,037}$$

**8.** Matematika órán a tanár röpdolgozatot íratott. Két feladatot tűzött ki. Az elsőt a tanulók 70%-a, a másodikat pedig a tanulók 60%-a oldotta meg. Minden induló megoldott legalább egy feladatot, és kilencen mindkét feladatot megoldották.

**a)** Hány diák írta meg a dolgozatot?

**b)** Az iskolába ellátogatott a matematika szaktanácsadó. A kijavított röpdolgozatok közül kettőt véletlenszerűen kihúzott. Mekkora a valószínűsége, hogy a kiválasztott dolgozatok egyike egy mindkét, a másik pedig csak az első feladatot megoldó tanulóé?

*Megoldás:*

**a)** Ha  $x$ -szel jelöljük a tanulók számát, akkor  $0,7x + (0,6x - 9) = x$ . Ebből  $x = 30$ . Mivel az első feladatot így 21 tanuló írta meg, közülük 9 a másodikat is megírta, és a „maradék” 9 tanuló csak a második feladatot, tehát a másodikat összesen 18 tanuló oldotta meg, és ez valóban a 30-nak 60%-a.

A dolgozatot tehát 30 tanuló írta meg.

**b)** Ha a kétfajta dolgozat kihúzásának sorrendje számít, akkor a következőképpen járhatunk el:

Annak a valószínűsége, hogy az elsőnek kihúzott dolgozatban mindkét feladat megoldott:  $\frac{9}{30}$ , azaz  $\frac{3}{10}$ .

Annak a valószínűsége, hogy a másodiknak kihúzott dolgozatban csak az első feladat megoldása szerepel:  $\frac{12}{29}$ .

Mindkét esemény együttes bekövetkezésének valószínűsége:  $\frac{12}{29}$ .

Mindkét esemény együttes bekövetkezésének valószínűsége:  $\frac{9}{30} \cdot \frac{12}{29} = \frac{36}{290}$ .

A fordított sorrendben kihúzás valószínűsége rendre  $\frac{12}{30}$  és  $\frac{9}{29}$ . Így ebben az esetben

mindkét esemény együttes bekövetkezésének valószínűsége:  $\frac{12}{30} \cdot \frac{9}{29} = \frac{36}{290}$ . Mivel a

szaktanácsadó vagy egyik, vagy másik sorrendben húzhatta ki a két dolgozatot, a ke-

resett valószínűség:  $2 \cdot \frac{36}{290} = \frac{72}{290} \approx 0,248$ .

Ha a kétfajta dolgozat kihúzásának sorrendje számít, akkor a következőképpen járhatunk el:

Mivel bármelyik dolgozat kihúzásának valószínűsége ugyanakkora, alkalmazhatjuk a klasszikus valószínűségszámítás modelljét. Az összes esetek száma:  $\binom{30}{2}$ , a kedvező

esetek száma:  $9 \cdot 12$ . A keresett valószínűség:  $\frac{9 \cdot 12}{\frac{30 \cdot 29}{2}} = \frac{72}{290} \approx 0,248$ .

9. Állapítsd meg, hogy mi azon körök középpontjainak halmaza, amelyek az  $e: 2x - y + 5 = 0$  és  $f: 2x - y = 3$  egyenletű egyenesek mindegyikét érintik!

*Megoldás:*

A keresett alakzat a két (párhuzamos) egyenes középpárhuzamosa. Az  $y$  tengelyt az  $e$  egyenes a  $(0;5)$ , az  $f$  egyenes pedig  $(0;-3)$  koordinátájú pontban metszi. Van olyan kör, amely mindkét egyenest érinti, és a középpontja e két pont által meghatározott szakasz  $F$  felezőpontja, hiszen az  $F$  pont a két egyenesből álló alakzatnak az egyik szimmetriaközéppontja.

Mivel az  $F(0;1)$ , a középpárhuzamosra illeszkedik, a keresett ponthalmaz egyenlete:  $y = 2x + 1$ .

10. Egy szabályos tizenkétszög oldalának hossza 4 cm. Milyen hosszú a sokszög legrövidebb átlója?

*Megoldás:*

A szabályos tizenkétszög minden belső szöge  $150^\circ$ -os. A sokszög legrövidebb átlója a két szomszédos oldal (nem közös) végpontjait összekötő  $d$  szakasz. Ennek hossza a koszinusztétel alkalmazásával kiszámítható:

$$d^2 = 4^2 + 4^2 - 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot \cos 150^\circ = 32 + 16\sqrt{3} = 16 \cdot (2 + \sqrt{3}) \approx 59,7.$$

$$d = 4\sqrt{2 + \sqrt{3}} \approx 7,7.$$

A legrövidebb átló hossza kb. 7,7 cm.

## II. EZZEL VÉGE?

Az utolsó foglalkozáson már nehéz a tanulókat gondosan kidolgozott megoldások leírására rávenni. Mégis szeretnénk, ha ez az idő is tartalmasan, töprengéssel telne el.

Tapasztalat szerint a tanulók kedvelik a tesztet, mert „nem kell annyit írni”, „lehet a választ annak alapján is kiválasztani, hogy melyiket tartom a legvalószínűbb eredménynek.” A tanárok egy része éppen az utóbbi miatt nem tartja megfelelő munkaformának a tesztet, pedig ha meggondoljuk, a tanuló későbbi életében sokszor adódhat olyan helyzet, amikor kevés információ alapján kell kiválasztania a lehetséges megoldások közül a legvalószínűbbet.

Erre a foglalkozásra 20 kérdésből álló tesztet készítettünk. (Lásd a tanári mellékletet.) A kérdések a tanév során tanult ismeretekre támaszkodnak. A tanári mellékletben megtalálható a feladatok megoldása, és megjelöltük a helyes válaszok betűjelét is.

Ha a tanár szeretné pontozással is ösztökélni a tanulókat arra, hogy ne véletlenszerűen válaszszanak a négy válasz közül, javasoljuk a következő pontozást:

Helyes válasz megjelölése: 6 pont.

Helytelen válasz megjelölése: (–1) pont.

Nem jelöli meg egyik választ sem: 0 pont.

A tesztet a megírás után azonnal ki lehet javítani például úgy, hogy a diákok kicserélik egymással tesztlapjaikat, és ők javítják. Ekkor nem célszerű a megoldást is megbeszélni, hanem sorban megadni a helyes válasz betűjelét, és utána, ha marad idő, a vitát kiváltó feladatok megoldása megbeszélhető.

**Teszt (Ismétlés)**

**Az alábbi feladatok mindegyikére négy válasz adott, amelyek közül pontosan egy helyes. Karikázd be az általad helyesnek vélt válasz betűjelét!**

1. Mivel egyenlő  $\log_2 \frac{2^{10} \cdot 2^{11}}{4^5}$  ?

- A:** 10                      **B:** 1                      **C:** 11                      **D:**  $2^{11}$

2. Mivel egyenlő  $\log_3 \sqrt[3]{3^{63}}$  ?

- A:** 62                      **B:** 21                      **C:**  $3^{21}$                       **D:** 0

3. Mivel egyenlő  $3 \cdot 0,5^{\log_{0,5} 3} \cdot 2^{\log_2 5}$  ?

- A:** 5                      **B:**  $27 \cdot 5$                       **C:**  $27 \cdot 15$                       **D:** 45

4. Hányszorosa a  $4^{18} + 4^{19}$  a  $20 \cdot 4^{17}$ -nek?

- A:**  $5 \cdot 4^{19}$                       **B:** 5                      **C:**  $\frac{4^{19}}{5}$                       **D:** 1

5. A valós számok halmazának mi a legbővebb részhalmaza, amelyen az  $f(x) = \frac{1}{\left(\log_4 \frac{1}{16}\right)^x}$

függvény értelmezhető?

- A:** A racionális számok halmaza.                      **B:** A pozitív egész számok halmaza.  
**C:** Az egész számok halmaza.                      **D:** A valós számok halmaza.

6. Melyik állítás hamis? „Ha egy valós szám

- A:** megegyezik a  $(-1)$ -edik hatványával, akkor a szám abszolútértéke 1.”  
**B:** nulladik hatványa 1, akkor a szám nem egyenlő nullával.”  
**C:** pozitív kitevőjű hatványa nulla, akkor a szám csak nulla lehet.”  
**D:** páros kitevőjű hatványa pozitív, akkor a szám is pozitív.”

7. 10-nek hányadik hatványával egyenlő a  $2^{\lg 2}$  ?

- A:**  $(\lg 2)^2$                       **B:**  $\lg 2$                       **C:**  $10^{2^{\lg 2}}$                       **D:**  $2 \lg 2$

8. A következő két egyenletnek hány közös valós megoldása van?

$$2^x - 2^{-x} = 3 \text{ és } 2^{2x} - 3 \cdot 2^x - 1 = 0$$

- A:** 1                      **B:** 2                      **C:** 3                      **D:** Egy sem.

9. Ha az  $A$  pont helyvektora  $\mathbf{a}(4;-3)$ , a  $B$  pont helyvektora  $\mathbf{b}(-1;4)$ , akkor az  $\overrightarrow{BA}$  vektor koordinátái:

- A:**  $(-5;7)$                       **B:**  $(3;-7)$                       **C:**  $(3;1)$                       **D:**  $(5;-7)$

10. A megadott egyenletű egyenesek közül melyik halad át az  $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 11 = 0$  egyenletű kör középpontján?

- A:**  $2x - 3y = 5$                       **B:**  $3x - y = 9$                       **C:**  $x + 3y + 2 = 0$                       **D:**  $y = 3$

11. Az  $e: x - 3y + 9 = 0$  és  $f: 2x - 3y = -12$  egyenletű egyenesek metszéspontja rajta van a  $g$  egyenesen, ha

- A:**  $g: 3y - x = 5$                       **B:**  $g: y = -2x - 3$                       **C:**  $g: 2x - y = 4$                       **D:**  $g: 4y - x = 11$

12. A  $P(-2;3)$  ponton átmenő, a  $2x - 3y = 0$  egyenletű egyenessel párhuzamos egyenes egyenlete:

- A:**  $3x + 2y = 0$                       **B:**  $y = \frac{2}{3}x + 4$                       **C:**  $3y - 2x = 13$                       **D:**  $2x - 3y = 12$

13. Egy rombusz egyik átlóegyenésének egyenlete:  $3x - 4y + 5 = 0$ , szimmetriaközéppontja:  $K(1; 2)$ . Melyik a rombusz másik átlóegyenésének egyenlete?

- A:**  $(3 - x)(2 - y) = x(y + 2) - 4$                       **B:**  $4x + 3y = 18$   
**C:**  $(x - 2)(y + 2) = (x + 1)(y + 6)$                       **D:**  $y = -\frac{3}{4}x + \frac{9}{2}$

14. Egy  $\alpha$  hegyesszögű derékszögű háromszögben  $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{2}{3}$ , a háromszög területe  $27 \text{ cm}^2$ .

Hány cm a két befogóhossz különbségének abszolútértéke?

- A:** 3                      **B:** 2,5                      **C:** 2                      **D:** 1,5m

15. Hány megoldása van a  $\frac{\sin^2 x - 3}{2 \cos x - 1} = 0$  egyenletnek a  $[-180^\circ; 360^\circ]$  intervallumon?  
**A:** Nincs megoldása      **B:** 1      **C:** 2      **D:** 3

16. Mekkora az **a** és **b** vektor hajlásszöge, ha  $\mathbf{a} = (\cos 800^\circ) \mathbf{i} + (\sin 800^\circ) \mathbf{j}$  és

$$\mathbf{b} = \cos(-100^\circ) \mathbf{i} - \sin(-100^\circ) \mathbf{j}?$$

- A:**  $160^\circ$       **B:**  $80^\circ$       **C:**  $20^\circ$       **D:**  $180^\circ$

17. Egy háromszög oldalainak hossza:  $a = 8$  cm,  $b = 15$  cm és  $c = 19$  cm. Szögei szerint milyen ez a háromszög?

- A:** Hegyesszögű      **B:** Tompaszögű      **C:** Derékszögű  
**D:** Van  $60^\circ$ -os szöge.

18. Egy szabályos dobókockát hatszor egymás után feldobunk. Mekkora a valószínűsége, hogy a dobott számok között legalább egy hatos dobás lesz?

- A:**  $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^6$       **B:**  $\frac{6^6 - 5^6}{6!}$       **C:**  $1 - \frac{5}{6}$       **D:**  $\left(\frac{5}{6}\right)^6$

19. Öt barát (Anna, Balázs, Cili, Dénes és Erika) moziba megy. Az öt jegy a 12. sor bal oldali 1.-5. helyére szól. Ha véletlenszerűen ülnek le, mekkora a valószínűsége, hogy Anna és Dénes egymás mellett, az 1-es és 2-es helyet foglalja el?

- A:**  $\frac{2}{\binom{5}{2}}$       **B:**  $\frac{12}{5!}$       **C:**  $\frac{3!}{5!}$       **D:** Egyik eddigi válasz sem helyes.

20. Öt barát (Anna, Balázs, Cili, Dénes és Erika) moziba megy. Az öt jegy a 12. sor bal oldali 1.-5. helyére szól. Véletlenszerűen ülnek le. Jelölje  $A$  azt az eseményt, hogy Anna és Dénes egymás mellett foglal helyet. Melyik művelet sor adja meg helyesen a kedvező esetek és az összes esetek számát, és így az  $A$  esemény valószínűségét?

- A:**  $P(A) = \frac{\binom{4}{1}}{\binom{5}{2}}$       **B:**  $P(A) = \frac{4!}{5!}$       **C:**  $P(A) = \frac{2 \cdot 4!}{5!}$       **D:**  $P(A) = \frac{\binom{4}{3}}{\binom{5}{2}}$

*Az ismétlő teszt feladatainak megoldása*

1. Mivel egyenlő  $\log_2 \frac{2^{10} \cdot 2^{11}}{4^5}$  ?

A: 10

B: 1

C: 11D:  $2^{11}$ 

*Megoldás:*  $\log_2 \frac{2^{10} \cdot 2^{11}}{4^5} = \log_2 \frac{2^{21}}{2^{10}} = \log_2 2^{11} = 11.$

2. Mivel egyenlő  $\log_3 \sqrt[3]{3^{63}}$  ?

A: 62

B: 21C:  $3^{21}$ 

D: 0

*Megoldás:*  $\log_3 \sqrt[3]{3^{63}} = \log_3 3^{21} = 21.$

3. Mivel egyenlő  $3 \cdot 0,5^{\log_{0,5} 3} \cdot 2^{\log_2 5}$  ?

A: 5

B:  $27 \cdot 5$ C:  $27 \cdot 15$ D: 45

*Megoldás:*  $3 \cdot 0,5^{\log_{0,5} 3} \cdot 2^{\log_2 5} = 3 \cdot 3 \cdot 5 = 45.$

4. Hányszorosa a  $4^{18} + 4^{19}$  a  $20 \cdot 4^{17}$ -nek?

A:  $5 \cdot 4^{19}$ 

B: 5

C:  $\frac{4^{19}}{5}$ D: 1

*Megoldás:*  $4^{18} + 4^{19} = 4^{18}(1 + 4) = 5 \cdot 4^{18} = 20 \cdot 4^{17}.$

5. A valós számok halmazának mi a legbővebb részhalmaza, amelyen az  $f(x) = \frac{1}{\left(\log_4 \frac{1}{16}\right)^x}$

függvény értelmezhető?

A: A racionális számok halmaza.

B: A pozitív egész számok halmaza.

C: Az egész számok halmaza.

D: A valós számok halmaza.

*Megoldás:*  $f(x) = \frac{1}{\left(\log_4 \frac{1}{16}\right)^x} = \frac{1}{(-2)^x}$ , és negatív számnak csak tetszőleges egész kitevőjű

hatványát értelmezzük.

## 6. Melyik állítás hamis?

„Ha egy valós szám

**A:** megegyezik a  $(-1)$ -edik hatványával, akkor a szám abszolútértéke 1.”

**B:** nulladik hatványa 1, akkor a szám nem egyenlő nullával.”

**C:** pozitív kitevőjű hatványa nulla, akkor a szám csak nulla lehet.”

**D:** páros kitevőjű hatványa pozitív, akkor a szám is pozitív.”

**Megoldás:** Az **A** állítás igaz, mert ha  $a = \frac{1}{a} \Leftrightarrow a^2 = 1 \Leftrightarrow |a| = 1$ .

A **B** állítás igaz, mert ha  $a^0 = 1$ , akkor mivel csak a nullának nem értelmezzük a nulladik hatványát, a többi számé viszont 1, tehát a feltételből következik, hogy  $a \neq 0$ .

A **C** állítás igaz, mert a pozitív számok pozitív kitevőjű hatványa pozitív, a negatív számok pozitív egész kitevőjű hatványa értelmezett, és az nem nulla. Csak a nulla pozitív kitevőjű hatványa nulla.

A **D** állítás hamis, mert pl.  $(-3)^2 = 9$ .

7. 10-nek hányadik hatványával egyenlő a  $2^{\lg 2}$ ?

**A:**  $(\lg 2)^2$

**B:**  $\lg 2$

**C:**  $10^{2^{\lg 2}}$

**D:**  $2 \lg 2$

**Megoldás:**  $10^x = 2^{\lg 2} > 0 \Leftrightarrow x = \lg 2^{\lg 2} = \lg 2 \cdot \lg 2 = (\lg 2)^2$ .

## 8. A következő két egyenletnek hány közös valós megoldása van?

$$2^x - 2^{-x} = 3 \text{ és } 2^{2x} - 3 \cdot 2^x - 1 = 0$$

**A:** 1

**B:** 2

**C:** 3

**D:** Egy sem.

**Megoldás:**  $2^x - 2^{-x} = 3 \Leftrightarrow 2^{2x} - 3 \cdot 2^x - 1 = 0$ , mert ha az első egyenlet mindkét oldalát megszorozzuk a pozitív értékű  $2^x$  kifejezéssel, és a kapott egyenletet nullára redukáljuk, a második egyenlethez jutunk. Ezért minden megoldásuk közös. A második egyenlet  $2^x$ -ben másodfokú, megoldásai:  $2^x = \frac{3 + \sqrt{13}}{2}$  vagy  $2^x = \frac{3 - \sqrt{13}}{2} < 0$ . A második megoldásnak  $2^x < 0$  miatt nincs értelme, az első pedig a 2-es alapú exponenciális függvény kölcsönösen egyértelmű hozzárendelése miatt pontosan egy megoldást ad.

9. Ha az  $A$  pont helyvektora  $\mathbf{a}(4;-3)$ , a  $B$  pont helyvektora  $\mathbf{b}(-1;4)$ , akkor a  $\overline{BA}$  vektor koordinátái:

A:  $(-5;7)$

B:  $(3;-7)$

C:  $(3;1)$

D:  $(5;-7)$

*Megoldás:*  $\overline{BA} = \mathbf{a} - \mathbf{b} = (5;-7)$ .

10. A megadott egyenletű egyenesek közül melyik halad át az  $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 11 = 0$  egyenletű kör középpontján?

A:  $2x - 3y = 5$

B:  $3x - y = 9$

C:  $x + 3y + 2 = 0$

D:  $y = 3$

*Megoldás:*  $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 11 = 0 \Leftrightarrow (x-2)^2 + (y+3)^2 = 2$ , ez pedig olyan kör egyenlete, amelynek a középpontja:  $K(2;-3)$ . Ennek a pontnak koordinátái csak a B egyenletet elégítik ki.

11. Az  $e: x - 3y + 9 = 0$  és  $f: 2x - 3y = -12$  egyenletű egyenesek metszéspontja rajta van a  $g$  egyenesen, ha

A:  $g: 3y - x = 5$

B:  $g: y = -2x - 3$

C:  $g: 2x - y = 4$

D:  $g: 4y - x = 11$

*Megoldás:* Az  $e$  és az  $f$  egyenes metszéspontja:  $M(-3;2)$ . Ennek a pontnak a koordinátái csak a D egyenletet elégítik ki.

12. A  $P(-2;3)$  ponton átmenő, a  $2x - 3y = 0$  egyenletű egyenessel párhuzamos egyenes egyenlete:

A:  $3x + 2y = 0$

B:  $y = \frac{2}{3}x + 4$

C:  $3y - 2x = 13$

D:  $2x - 3y = 12$

*Megoldás:* A keresett egyenes egyik normálvektora  $\mathbf{n}(2;-3)$ , pontja  $P(-2;3)$ , így egyenlete  $2x - 3y = -13 \Leftrightarrow 3y - 2x = 13$ .

13. Egy rombusz egyik átlóegyenésének egyenlete:  $3x - 4y + 5 = 0$ , szimmetriaközéppontja:  $K(1; 2)$ . Melyik a rombusz másik átlóegyenésének egyenlete?

A:  $(3-x)(2-y) = x(y+2) - 4$

B:  $4x + 3y = 18$

C:  $(x-2)(y+2) = (x+1)(y+6)$

D:  $y = -\frac{3}{4}x + \frac{9}{2}$

**Megoldás:** A rombusz átlói merőlegesen felezik egymást. A keresett egyenes egyik normálvektora  $\mathbf{n}(4;3)$ , pontja a  $K(1;2)$ , így az egyenlete:  $4x + 3y = 10$ .

$$(3-x)(2-y) = x(y+2) - 4 \Leftrightarrow 6 - 2x - 3y = 2x - 4 \Leftrightarrow 4x + 3y = 10.$$

14. Egy  $\alpha$  hegyesszögű derékszögű háromszögben  $\operatorname{ctg}\alpha = \frac{2}{3}$ , a háromszög területe  $27 \text{ cm}^2$ .

Hány cm a két befogóhossz különbségének abszolútértéke?

**A:** 3

**B:** 2,5

**C:** 2

**D:** 1,5m

**Megoldás:** A  $\operatorname{ctg}\alpha = \frac{2}{3}$  feltételből (és a hegyesszög kotangensének definíciójából) következik,

hogy a háromszög befogóinak hossza:  $2x$  és  $3x$ . Így a területe:  $27 = T = \frac{2x \cdot 3x}{2}$ , azaz

$$x^2 = 9, \text{ és ebből } 0 < x = 3 \text{ (cm).}$$

15. Hány megoldása van a  $\frac{\sin^2 x - \frac{3}{4}}{2 \cos x - 1} = 0$  egyenletnek a  $[-180^\circ; 360^\circ]$  intervallumon?



**A:** Nincs megoldása

**B:** 1

**C:** 2

**D:** 3

**Megoldás:**  $\frac{\sin^2 x - \frac{3}{4}}{2 \cos x - 1} = 0 \Leftrightarrow \sin^2 x - \frac{3}{4} = 0 \text{ és } 2 \cos x - 1 \neq 0$ .



A bal oldali ábrán azt a 4 egységvektort rajzoltuk meg, amelyek irányszögei megoldásai az első egyenletnek, míg a másik ábrán közülük azt a kettőt, amelyek irányszögei nem megoldásai az egyenletnek. Tehát az egyenlet megoldásai a II. és III. síknegyedben lévő egységvektorok irányszögei. Ha az  $\mathbf{i}$  vektor  $(-180^\circ)$ -os elforgatottjából kiindulva növeljük a forgásszögét  $0^\circ$ -osra, majd tovább növeljük  $360^\circ$ -ig, a két vektort összesen 3-szor érjük el, ami azt jelenti, hogy a  $[-180^\circ; 360^\circ]$  intervallumban pontosan 3 megoldása van az egyenletnek  $(120^\circ, -120^\circ, 240^\circ)$ .

16. Mekkora az  $\mathbf{a}$  és  $\mathbf{b}$  vektor hajlásszöge, ha  $\mathbf{a} = (\cos 800^\circ) \mathbf{i} + (\sin 800^\circ) \mathbf{j}$  és

$$\mathbf{b} = \cos(-100^\circ) \mathbf{i} - \sin(-100^\circ) \mathbf{j}?$$

**A:**  $160^\circ$

**B:**  $80^\circ$

**C:**  $20^\circ$

**D:**  $180^\circ$

*Megoldás:*  $\mathbf{a} = (\cos 800^\circ) \mathbf{i} + (\sin 800^\circ) \mathbf{j} = (\cos 80^\circ) \mathbf{i} + (\sin 80^\circ) \mathbf{j}$ , az  $\mathbf{a}$  és  $\mathbf{i}$  vektor hajlásszöge  $80^\circ$ .

$$\cos(-100^\circ) \mathbf{i} - \sin(-100^\circ) \mathbf{j} = \cos(-100^\circ) \mathbf{i} + (-\sin(-100^\circ)) \mathbf{j} = \cos 100^\circ \mathbf{i} + \sin 100^\circ \mathbf{j},$$

így a  $\mathbf{b}$  vektor a II. síknegyedben rajzolható meg, a  $\mathbf{b}$  és  $\mathbf{i}$  vektor hajlásszöge  $100^\circ$ . Az  $\mathbf{a}$  és  $\mathbf{b}$  vektor hajlásszöge  $20^\circ$ .

17. Egy háromszög oldalainak hossza:  $a = 8$  cm,  $b = 15$  cm és  $c = 19$  cm. Szögei szerint milyen ez a háromszög?

**A:** Hegyesszögű

**B:** Tompaszögű

**C:** Derékszögű

**D:** Van  $60^\circ$ -os szöge.

*Megoldás:*  $19^2 = 8^2 + 15^2 - 16 \cdot 15 \cdot \cos \gamma$  egyenletből  $16 \cdot 15 \cdot \cos \gamma = -72$ , azaz  $\cos \gamma$  negatív, tehát a háromszög tompaszögű.

18. Egy szabályos dobókockát hatszor egymás után feldobunk. Mekkora a valószínűsége, hogy a dobott számok között legalább egy hatos dobás lesz?

**A:**  $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^6$

**B:**  $\frac{6^6 - 5^6}{6!}$

**C:**  $1 - \frac{5}{6}$

**D:**  $\left(\frac{5}{6}\right)^6$

*Megoldás:* Annak a valószínűsége, hogy egyik dobott szám sem lesz 6-os:  $\left(\frac{5}{6}\right)^6$ . A kérdés,

ennek az eseménynek a komplementere, ennek a valószínűsége  $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^6$ .

19. Öt barát (Anna, Balázs, Cili, Dénes és Erika) moziba megy. Az öt jegy a 12. sor bal oldali 1.-5. helyére szól. Ha véletlenszerűen ülnek le, mekkora a valószínűsége, hogy Anna és Dénes egymás mellett, az 1-es és 2-es helyet foglalja el?

$$\mathbf{A:} \frac{2}{\binom{5}{2}}$$

$$\mathbf{B:} \frac{12}{5!}$$

$$\mathbf{C:} \frac{3!}{5!}$$

**D:** Egyik eddigi válasz sem helyes.

*Megoldás:* Ha Anna és Dénes leül valamilyen sorrendben az 1-es és 2-es székre, a 3.-5. helyekre a többi három ember  $3!$ -féleképpen foglalhat helyet. Ha Anna és Dénes fordított sorrendben ül le a két helyre, ekkor is  $3!$ -féle leülési lehetősége van B-nek, C-nek és E-nek. Így a kedvező esetek száma:  $2 \cdot 3!$ . Az összes esetek száma:  $5!$ , tehát  $\mathbf{P} = \frac{2 \cdot 3!}{5!}$ .

**20.** Öt barát (Anna, Balázs, Cili, Dénes és Erika) moziba megy. Az öt jegy a 12. sor bal oldali 1.-5. helyére szól. Véletlenszerűen ülnek le. Jelölje  $A$  azt az eseményt, hogy Anna és Dénes egymás mellett foglal helyet. Melyik művelet sor adja meg helyesen a kedvező esetek és az összes esetek számát, és így az  $A$  esemény valószínűségét?

$$\mathbf{A:} \mathbf{P}(A) = \frac{\binom{4}{1}}{\binom{5}{2}}$$

$$\mathbf{B:} \mathbf{P}(A) = \frac{4!}{5!}$$

$$\mathbf{C:} \mathbf{P}(A) = \frac{2 \cdot 4!}{5!}$$

$$\mathbf{D:} \mathbf{P}(A) = \frac{\binom{4}{3}}{\binom{5}{2}}$$

*Megoldás:* Az  $A$  esemény bekövetkezik az A, B, C, D és E minden olyan permutációjával, amelyben A és D egymást követő elemek. A kedvező esetek száma megegyezik ezeknek a permutációknak a számával. Ezek száma pedig:  $2 \cdot 4!$  ( $= 48$ ). Az összes lehetséges kimenetek száma: az öt elem összes permutációjának száma, azaz  $5!$  ( $= 120$ ), így

$$\mathbf{P}(A) = \frac{2 \cdot 4!}{5!}.$$