

Egy gombaismereti szakkönyv az alábbiakat írja a légyölő galócáról.

Légyölő galóca (*Amanita muscaria*)

A légyölő galóca nagy méretű, 10-25 cm nagyra is megnövő, feltűnő külsejű kalapos gomba. Erősen savanyú talajú erdőkben, főleg fenyvesekben gyakori. Termőtestet főleg augusztustól novemberig, a fagyok beköszöntéig fejleszt. A fiatal gomba kezdetben tyúktojás nagyságú és formájú. Növekedése során tönkje megnyúlik, kalapja 5-20 cm átmérőjűre nő és ellaposodik. A nagy felületű kalap élénk vörös színű, rajta lencse nagyságú fehér pettyek találhatók. Spóráit sűrűn álló, fehér színű lemezes termőréttegében képezi. Tönkje 7-20 cm magas, 1-3 cm vastag, fehér színű. Rajta jól fejlett gallér van. A tönk alsó része kiszélesedik, bocskora azonban nincs. Mérgező gomba, elfogyasztását követő néhány órán belül a részegség tüneteit okozza, később erős gyomor- és bélpanaszok jelentkeznek. Ennek a gombának is van olyan párja, amellyel összekeverhető. Ha piros kalapjáról lemosódnak a fehér pettyek, összetéveszthető az ehető császárgalócával, amely azonban fejlett bocskorral rendelkezik.

Írd a kifejlett gomba jellemzőit röviden, lényegre törően, szinte csak a kulcsszavakat kiemelve a táblázat megfelelő helyére!

Légyölő galóca	
Élőhelye	
Előfordulási ideje	
Mérete	
Kalapja - mérete, formája - színe - lemezei/csövecs kái	
Tönkje - mérete, formája - színe - gallér - bocskor	
Étkezési értéke	
Egyéb megjegyzés	

A fenti leírás alapján rajzold le méretarányosan, a határozó bélyegekre ügyelve a légyölő galócát!

